

Tortuga cabezona o Caguama


Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

Esta especie, tal como uno de sus nombre común indica, se caracteriza por presentar una cabeza desproporcionadamente grande con respecto al tamaño de su cuerpo.

LA CABEZA Y LA PARTE SUPERIOR DEL CAPARAZÓN

tiene un color que puede variar desde amarillo-naranja hasta marrón-rojizo, mientras que el plastrón (parte inferior) es típicamente de color amarillo pálido.

Escudos precentrales



5 escudos laterales

CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA

REINO: Animalia

FILO: Chordata

CLASE: Reptilia

SUBCLASE: Anapsida

ORDEN: Testudines

SUPERFAMILIA: Cheloniioidea

FAMILIA: Cheloniidae

GÉNERO: *Caretta*

Rafinesque, 1814

ESPECIE: *C. caretta*

(Linnaeus, 1758)

ESTUDIOS SOBRE EL CRECIMIENTO DE ESTA ESPECIE HACEN ESTIMACIONES MUY VARIADAS SOBRE LA EDAD A LA QUE ALCANZAN LA MADUREZ SEXUAL, YA QUE EL RANGO VA **DESDE LOS 14.5 A LOS 30 AÑOS**, CON UN TAMAÑO DE **66.5-84.7 CM DE LCC** (WITHERINGTON ET AL., 2006; CASALE ET AL., 2011).

LA TORTUGA CABEZONA ES OMNÍVORA Y PRESENTA LA DIETA MÁS VARIADA ENTRE TODAS LAS ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS.

ESQUELETO DE UNA TORTUGA



Esta especie prefiere las playas subtropicales para anidar. En el Atlántico la temporada de anidación sucede entre los meses de mayo a agosto con intervalos de anidación cada 2 a 4 años y con una frecuencia promedio de desove de 4 nidadas por temporada reproductiva con un periodo aproximado de 15 días entre posturas y 117 huevos por nido (Witherington et al. 2006).



FOTO: DR. PETER MEYLAN
INFOGRAFÍA: NELSON FERNÁNDEZ



MINISTERIO DE AMBIENTE

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

